

Von der STIKO empfohlene Standardimpfungen für Erwachsene unter Immunsuppression

STIKO-Empfehlung	Art des Impfstoffes	Grundimmunisierung	Auffrischung
Tetanus	T	3x (0, 4-8 W, 12 M nach 2. Impfung)	Alle 10 Jahre
Diphtherie	T	3x (Woche 0, 4-8, Monat 12 nach 2. Impfung)	Alle 10 Jahre
Pertussis	T	1x	Einmalig im Rahmen der nächsten Td-Auffrischung
Polio (IPVP)	T	3x	Nur bei fehlender Auffrischung im Jugendalter
Influenza	T	1x	Jährlich
Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff	T	Je 1x PCV13, dann PPSV23	Bei Immunsuppression nach Monat 2 (besser Monat 6-12), Impfstoffwechsel zu PPSV23 (oder PCV13, falls vorgeimpft mit PPSV23), danach alle 6 Jahre
Meningokokken (Men A,C,W,Y und Men B)	T	MenACWY Konjugat-Impfstoff 1x, MenB 2x, Mindestabstand nicht weniger als 1 Monat	MenACWY: Auffrischung möglich. MenB: Notwendigkeit derzeit nicht bekannt
Hepatitis B	T	3x (Monat 0, 1, 6)	Auffrischung, wenn anti-HBs-Titer < 100 IE/l
Herpes Zoster Infektion (Personen ab 50 Jahre)	T	2-malige Impfung im Abstand von 2-6 Monaten	Keine Angaben